МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

и АРМЯНСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СХЕМАТИЧЕСКАЯ

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА

МАЛОГО КАВКАЗА

Масштаб 1:500000

км 0 5 10 15 20 25 км

Составил К. Н. ПАФФЕНГОЛЬЦ

по данным личных исследований (1923—1946 гг.) и литературным материалам

ЛЕНИНГРАД—ЕРЕВАН

1947 г.

СХЕМА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗОН КАВКАЗА

1946 г.

Масштаб 1:6 000 000

СХЕМА БОЛЬШОГО КАВКАЗА ПО В. П. РЕНГАРТЕНУ (1937 г.)

СХЕМУ МАЛОГО КАВКАЗА СОСТАВИЛ К. Н. ПАФФЕНГОЛЬЦ (1946 г.)

I— Зона Предкавказья
а—Ставропольское плато; б—Депрессия Кубани и Терека

II—Складчатая зона Большого Кавказа:
а—Восточная часть северного склона; б—Центральная часть северного склона;
с—Западная часть северного склона; d—Подзона южного склона;
е—Кахетино - Вандамская подзона; f—Подзона погружения

III—Рионско - Куринский складчатый комплекс:
а—Абхазско - Рачинская подзона; б—Рионско - Дзирульская подзона;
г—Карадагско - Куринская подзона

IV—Аджаро - Триалетская складчатая зона

V—Сомхетско - Гандзинская полускладчатая зона

VI—Складчатая зона Армении

VII—Нахичеванская складчатая зона

Гравитационные тектонические покровы

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕКТОНИЧЕСКОЙ КАРТ

1. Главными орогеническими фазами Малого Кавказа являются верхнемеловые и затем верхнеэоценовая (пиренейская). С миоцена до постплиоцена здесь происходили только поднятия на фоне кратковременных остановок и опусканий. Наибольшие поднятия происходили в неогене. К северо-западу указанная верхнеэоценовая фаза прогрессивно запаздывала, переходя постепенно в олигоценовое и даже в нижнемиоценовое время, так как на юге и юго-востоке структуры и разрывы верхнеэоценового времени отчетливо перекрываются весьма слабо дислоцированными олигоценом, а на крайнем северо-западе в надвиговых структурах участвуют и олигоценовые отложения (майкоп).

2. Малый Кавказ не соединяется в структурном отношении с Большим Кавказом, а отделен от него Рионско-Куринским синклинорием и представляет три самостоятельных антиклинория, разделенных соответствующими синклинориями. Малый Кавказ является по отношению к Большому Кавказу более древним горным сооружением (структура его определилась окончательно в верхнеэоценовое время) и отдельные этапы его формирования большей частью разновременны.

3. Малый Кавказ естественно подразделяется на четыре тектонические зоны (с севера на юг): 1) Аджаро-Триалетскую интенсивно-складчатую, 2) Сомхетско - Гандзинскую полого - складчатую, 3) Ярмянскую складчатую и 4) Нахичеванскую складчатую; они группируются попарно в два тектонических комплекса, разделенных крупным Муровдагским надвигом (подвигом). От Большого Кавказа Малый отделен сложным Рионско-Куринским складчатым комплексом, подчиненным общим горным сооружениям.

4. Движение масс происходило в Малом Кавказе с юга на север, а в Большом—с севера на юг. Складки антикавказского направления разновозрастны; обусловлены различным гипсометрическим положением древнего субстрата, разбитого на ряд глыб в результате предшествовавших фаз оро- и эпейрогенеза. Эти древние структуры, будучи не везде „переварены", обусловили местами поперечное строение.

5. Сейсмичность области обусловлена эпейрогенезом, заканчивающим формирование горного сооружения Малого Кавказа. Все новейшие сейсмические очаги приурочены к тем или иным тектоническим структурам и линиям; наиболее сильные землетрясения приурочены к границам (швам) тектонических зон (комплексов).

6. Основные и ультраосновные породы приурочены к предкавказской зоне с наиболее интенсивной пликативной дислокацией. На юге прорывают средний эоцен и перекрыты олигоценом. На северо - западе родственные им породы прорывают и нижний миоцен, будучи связаны с верхнемиоценовой (аттической) орогенической фазой. Кислые и средние интрузивы приурочены большей частью к сводовым зонам крупных антиклиналей (к зонам со спокойной складчатостью) и реже ядрам синклиналей (Дашкесан). Наблюдаемое разнообразие пород находится в соответствии с глубиной эрозионного среза.

7. Малый Кавказ попадает целиком в полосу положительных аномалий. Нулевая изоаномала силы тяжести на северо-западе почти совпадает с направлением фронтального надвига. Распределение участков с максимумом аномалий крайне неравномерное; гравитационная ось пересекает участки с различной геологической структурой, что находится, следовательно, в связи с литологическим составом пород. Максимумы в Талыше, Шуше, Севане и в Базобальском хребте связаны с основными и ультраосновными породами, а в нижнем течении р. Куры и у Багдади—с нефтеносностью. Полоса невысоких аномалий по Араксу приурочена в основном к зоне погружения палеозойских отложений. Кюрдамирский „мост" положительных аномалий (меридиональный гравитационный хребет) отвечает, видимо, нефтеносным структурам.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА КАВКАЗА

Составил М. С. Абакелия в 1934-35 г.

Масштаб 1:4 000 000

км 40 0 80 120 км

Условные обозначения

- ...м Гравиметрический пункт. Поставленные у пункта числа выражают значение физической (g_{45}) аномалии в mgal
- Положительная изоаномала
- Отрицательная изоаномала — Изоаномалы проведены через 20 mgal
- Нулевая изоаномала
- Населенные пункты

Тбилисский Геофизический Институт Грузинского филиала Академии наук СССР (ТИГЕФИАН)

Проекция Гаусса-Крюгера

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

- ЕРЕВАН — Столицы ССР
- ЛЕНИНАКАН — Города
- СЕВАН — Поселки городского типа, рабочие и рудничные поселки
- Арзни — Курорты
- Алаверди — Прочие населенные пункты на территории СССР (села и станицы)

Примечание. На листах подчеркнуты:
НАХИЧЕВАНЬ — центры АССР
СТЕПАНАКЕРТ — центры автономных областей
Вед. Тапа — центры районов

Населенные пункты заграничных территорий
- Иджеван — Большие населенные пункты (центры вилайетов и казы)
- Тузлукан — Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

- Государственные
- ССР
- АССР
- Автономных областей

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
- Метеки — Электрифицированные
- Нефтяная — Нормальной колеи
- Узкоколейные
- Шоссе
- Грунтовые улучшенные дороги
- Грунтовые дороги
- пер. Гачагло — Тропы вьючные и перевалы

- Оси антиклиналей
- Надвиги
- Сбросы и взбросы
- Четвертичные лавы и вулканические туфы (контуры схематизированы)
- Вулканические кокусы (центры излияний и извержений)
- Олигоцен. Вулканогенная толща
- Олигоцен. Соленосная толща и ее аналоги
- Дзирульский кристаллический массив (обнаженная часть)
- Кислые и средние интрузии
- Основные и ультраосновные интрузии (главнейшие)
- Нулевая изоаномала силы тяжести (в редукции Фая). По данным М. С. Абакелия
- Направление движения масс

Составлено, оформлено к изданию на Картографической фабрике Государственного издательства геологической литературы Министерства геологии СССР
Редактор-картограф Н. Ф. Суханова и Н. А. Луковникова
Ответственный редактор В. Г. Грушевой
Заказ № 1 (1) 31-а. А (1931) Тираж 2000 экз.
Подписано к печати 5/VIII 1947 г.